MA-34A Probab. y Procesos Estocásticos **11 de Mayo, 1999**

Lista de Distribuciones

Prof. Cátedra: M. Kiwi *Prof. Auxiliar: M. Saez*

Modelos discretos: A continuación se da la fórmula de la función densidad de probabilidad p_X y los parámetros de varias distribuciones importantes de variables aleatorias X discretas. También se especifica el soporte S_X de cada tipo de variable aleatoria.

BERNOULLI: X es una Bernoulli de parámetro $p \in [0,1]$, i.e., $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, si

$$p_X(i) = p^i(1-p)^{1-i}, \qquad \text{si } i \in S_X = \{0,1\}.$$

BINOMIAL: X es una binomial de parámetros $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [0,1]$, i.e., $X \sim \text{Binomial}(n,p)$, si

$$p_X(i) = \binom{n}{i} p^i(1-p)^{n-i}, \qquad \text{si } i \in S_X = \{0,\ldots,n\}.$$

GEOMÉTRICA: X es una geométrica de parámetro $p \in (0,1]$, i.e., $X \sim \text{Geomtrica}(p)$, si

$$p_X(i) = (1-p)^{i-1}p, \qquad \text{si } i \in S_X = \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

PASCAL: X es una Pascal de parámetros $r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y $p \in (0,1]$, i.e., $X \sim \text{Pascal}(r,p)$, si

$$p_X(i) = \binom{i-1}{r-1} p^r(1-p)^{i-r}, \qquad \text{si } i \in S_X = \{r, r+1, r+2, \ldots\}.$$

HIPERGEOMÉTRICA: X es una hipergeométrica de parámetros $M, N, n \in \mathbb{N}$, $n \leq \max\{M,N\}$, i.e., $X \sim \text{Hiper}(n,N,M)$, si

$$p_X(i) = \frac{\binom{M}{i}\binom{N}{n-i}}{\binom{N+M}{n}}, \qquad \text{si } i \in S_X = \{0,\ldots,n\}.$$

POISSON: X es una Poisson de parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$, i.e., $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, si

$$p_X(i) = \frac{1}{i!}\lambda^i e^{-\lambda}, \qquad \text{si } i \in S_X = \mathbb{N}.$$

Modelos absolutamente continuos: A continuación se da la fórmula de la función de densidad f_X y los parámetros de varias distribuciones importantes de variables aleatorias X absolutamente continuas. También se especifica el soporte S_X de cada tipo de variable aleatoria.

UNIFORME: X es una uniforme de parámetros $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, i.e., $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \qquad \text{si } x \in S_X = [a, b].$$

EXPONENCIAL: X es una exponencial de parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$, i.e., $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, si

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad \text{si } x \in S_X = [0, +\infty).$$

NORMAL: X es una normal de parámetros $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, i.e., $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \qquad \text{si } x \in S_X = \mathbb{R}.$$

GAMA: X es una gama de parámetros $\lambda, p \in \mathbb{R}$, $\lambda, p > 0$, i.e., $X \sim \text{Gama}(p, \lambda)$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(p)} \lambda(\lambda x)^{p-1} e^{-\lambda x}, \qquad \text{si } x \in S_X = [0, +\infty), \quad \text{y } \Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx.$$

CHI-CUADRADO: X es una chi-cuadrado con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ grados de libertad, i.e., $X \sim \chi^2_n$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{n/2}\,\Gamma(n/2)}\, x^{n/2-1}\, e^{-x/2}, \qquad \text{si } x \in S_X = (0, +\infty), \quad \text{y } \Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx.$$

CAUCHY: X es una Cauchy de parámetro $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, i.e., $X \sim \text{Cauchy}(\mu, \sigma)$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\sigma\,\left(1 + \frac{1}{\sigma^2}\,(x-\mu)^2\right)}, \qquad \text{si } x \in S_X = \mathbb{R}.$$

LAPLACE: X es una Laplace de parámetros $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, i.e., $X \sim \text{Laplace}(\mu, \sigma)$, si

$$f_X(x) = \frac{1}{2\sigma}\, e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}}, \qquad \text{si } x \in S_X = \mathbb{R}.$$

BETA: X es una beta de parámetros $a, b \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$, i.e., $X \sim \text{Beta}(a, b)$, si

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\, x^{a-1}(1-x)^{b-1}, \qquad \text{si } x \in S_X = [0, 1], \quad \text{y } \Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx.$$

WEIBULL: X es una Weibull de parámetros $v, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, i.e., $X \sim \text{Weibull}(v, \alpha, \beta)$, si

$$f_X(x) = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x-v}{\alpha}\right)^{\beta}} \qquad \text{si } x \in S_X = (v, +\infty).$$